

Información sobre **LOS IMPLANTES**



¿Qué es un Implante?

El Implante es un método anticonceptivo para las mujeres que consiste en colocar una varilla flexible (del tamaño de un fósforo) debajo de la piel en la parte superior del brazo. Este método dura hasta tres años.

¿Cómo funciona?

Al igual que las pastillas anticonceptivas, el Implante libera una hormona femenina en el cuerpo, que previene el embarazo de las siguientes maneras:

- Evita que el cuerpo libere un óvulo que podría fecundar el espermatozoide de un hombre

- Cambia el estado del moco cervical y así es más difícil que el espermatozoide entre al útero
- Evita que un óvulo fecundado se adhiera a las paredes del útero

¿El método es efectivo?

Los Implantes evitan un embarazo en el 99% de los casos. Son tan buenos como una ligadura de trompas pero no son permanentes.

¿Por qué un Implante me serviría a mí?

Una vez que se colocó el Implante, ya no hay nada más que hacer. Los Implantes

funcionan solos durante tres años. Si usted quiere quedar embarazada antes de que termine este período de tres años, el Implante se podría quitar y recuperará su fertilidad rápidamente.

¿Quiénes no deberían usar el Implante?

No debería usarlo si:

1. Piensa que está embarazada
2. Ha tenido cáncer de mama o tumores hepáticos
3. Su vagina sangra de manera inusual

Información sobre los Implantes, continuación

¿Tendré algún problema si uso el Implante?

La mayoría de las mujeres no tienen demasiados problemas. Aunque muchas notan un cambio en la frecuencia de su período menstrual. Hay quienes menstrúan más, otras menos y algunas nada. Estos cambios son comunes. Una vez que el cuerpo se acostumbra al Implante, los períodos menstruales podrían normalizarse.

A veces, debido al Implante, podría aumentar de peso, tener dolor de estómago, sentirse nerviosa o malhumorada y sufrir de acné o dolores de cabeza. En general, estos problemas no duran demasiado.

¿Puedo usarlo si estoy tomando otro medicamento?

El Implante no funcionará tan bien si está tomando medicamentos para las convulsiones, ciertos antibióticos y fitofármacos (como St. John's Wort). Hable con su proveedor médico sobre los medicamentos que está tomando antes de decidir usar el Implante.

¿Hay algunos síntomas a los que deba estar atenta?

Si bien no se dan problemas graves, el Implante es parte de la medicina y puede causar algunos problemas en ciertas personas. Llame al médico o a la enfermera si aparece cualquiera de estos síntomas:

1. Hemorragia intensa y continua en su vagina.
2. Dolor en el brazo o presencia de pus, sangre o piel roja en donde colocaron el Implante.
3. Se salió la varilla del Implante.
4. Dolor fuerte en el estómago, en las piernas o en el pecho.
5. Dificultad respiratoria o problemas repentinos para ver o hablar.
6. Dolor de cabeza fuerte, mareos o vómitos.

Evite fumar mientras usa el Implante para mantener un estado más saludable.

¿Dónde puedo conseguir un Implante?

Comuníquese con su centro de salud local para encontrar un proveedor.

¿Puedo amamantar si tengo un Implante?

Sí, pero es mejor esperar alrededor de 4 semanas para poder hacerlo.

¿Cómo se quita un Implante?

Si bien el Implante es efectivo por tres años, se puede quitar antes. El proveedor médico anestesiará la zona y, a través de una pequeña incisión, lo quitará. Esto lleva tan sólo unos minutos. La extracción se puede complicar si el Implante se ha movido del lugar original o si hay tejido cicatrizante alrededor de la herida. En ese momento se puede colocar un nuevo Implante.

RECUERDE:

Los Implantes no la protegerán del VIH, el SIDA o cualquier otra enfermedad que pueda contagiarse al tener sexo. Si quiere cuidarse, cada vez que tenga relaciones sexuales, utilice un condón de látex.

NÚMERO TELEFÓNICO DEL MÉDICO/CLÍNICA:

Esta publicación fue posible gracias a la subvención nacional Title X Family Planning Grant.